

# RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ davant l'**ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA (ACR)** el context de la infecció pel **Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Donada la situació d'excepcionalitat de la pandèmia Covid-19 i la necessitat d'evitar-ne la propagació, es proposen les següents recomanacions:



## PUNTS CLAU PER USVB

- Anticipar-nos posant-nos **EPI complet**, si tenim informació prèvia. En cas de portar **EPI bàsic** (amb bata convencional) iniciar les compressions mentre el nostre company es posa **EPI complet** i ens fa el relleu per equipar-nos.
- Realitzar **compresions toràciques ininterrompudes**.
- **No realitzar ventilacions amb ambú®** (excepció: nens-RCP estàndard, amb 5 ventilacions inicials).
- **Utilització de DEA** (desfibril·lació precoç).

## PUNTS CLAU PER USVA

- Anticipar-nos posant-nos **EPI complet**, si tenim informació prèvia. En cas de portar **EPI bàsic** (amb bata convencional) iniciar les compressions mentre el nostre company es posa **EPI complet** i ens fa el relleu per equipar-nos.
- **Compressions i desfibril·lació precoç**.
- Ventilació: prioritzar **dispositiu supraglòtic + Ambú® amb filtre**.
- Seguir resta algoritmes d'SVA.

**Evitat iniciar la RCP en aquelles circumstàncies en que aquesta sigui fútil (p.e. ACR no presenciades amb ritme no desfibril·lable)**

[Veure document de referència](#)