



Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 7 d'abril del 2020 (15h) són:

- eCDC (última actualització: 1 d'abril del 2020)
- CDC (última actualització: 3 d'abril del 2020)

L'OMS amb data 6 d'abril del 2020 publica recomanacions sobre l'ús de mascaretes:

- Les mascaretes quirúrgiques i FFP s'han de reservar pels professionals sanitaris.
- En persones sanes, no hi ha evidència de que l'ús de mascaretes pugui prevenir-les del contagi per COVID-19.
- Avantatges:
 - o Reduir el risc potencial d'exposició a persones infectades contagioses durant el període pre-sintomàtic.
 - o Reduir la estigmatització de persones que porten mascareta perquè estan infectades.
- Riscs potencials:
 - o Auto-contaminació per tocar la mascareta si aquesta ha estat contaminada.
 - o Dificultat en respirar depenent de la mascareta que s'utilitzi.
 - o Falsa sensació de seguretat que faci oblidar mesures essencials de prevenció de la infecció (higiene de mans, distància social, etc).
 - o Escassetat de mascaretes per treballadors sanitaris.
- És important desenvolupar una estratègia de comunicació per explicar a la població d'una manera clara quines mascaretes s'han de portar, quan i com i, a més, la importància de seguir estrictament totes les altres mesures de prevenció i control de la infecció.
- No hi ha evidències per fer recomanacions ni a favor ni en contra de l'ús de mascaretes de roba en la ciutadania.
- Les mascaretes de roba no es consideren adequades pels treballadors sanitaris. Si en

situació d'escassetat, a nivell local, es proposa l'ús de mascaretes en sanitaris, les autoritats locals han de garantir uns estàndards mínims específics i unes especificacions tècniques.

L'OMS amb data 6 d'abril del 2020 publica recomanacions per l'ús racional d'EPI i consideracions durant escassetat:

- Es descriuen estratègies per optimitzar la disponibilitat d'EPI en centres sanitaris: minimitzar l'ús d'EPI, assegurar l'ús apropiat i racional d'EPI, coordinar el subministrament d'EPI.
- Quan hi ha escassetat d'EPI és crucial protegir als treballadors sanitaris.
- S'inclouen mesures temporals quan hi ha escassetat severa d'EPI. Per cada opció hi ha una descripció de com utilitzar la mesura, quines limitacions té, criteris per l'eliminació d'EPI i precaucions i viabilitat.
- S'inclouen quines opcions no recomana l'OMS:
 - o Ús dels mateixos guants per cohorts de COVID-19 i utilitzar doble guant.
 - o Reutilització de mascaretes, bates o ulleres sense una descontaminació/esterilització adequada.
 - o Utilització de mascaretes de roba com una alternativa a les quirúrgiques o FFP. Si en situació d'escassetat, a nivell local, es proposa l'ús de mascaretes en sanitaris, les autoritats locals han de garantir uns estàndards mínims específics i unes especificacions tècniques.

El Ministerio amb data 7 d'abril del 2020 publica guia per la utilització de tests ràpids d'anticossos:

- Només es realitzaran en pacients simptomàtics, moderats o greus en l'àmbit hospitalari, o lleus en l'àmbit extrahospitalari.
- En l'àmbit hospitalari: en pacients amb alta sospita clínica. Si surt positiu, es confirma el diagnòstic, si surt negatiu, es realitza PCR.
- En l'àmbit extrahospitalari:
 - o Es prioritza en residències geriàtriques i centres socio-sanitaris.
 - Indicat en pacients simptomàtics si han passat dies des de l'inici de símptomes.
 - Si hi ha diversos residents amb símptomes compatibles amb COVID-19, només amb una prova positiva es considerarà que hi ha brot. Es tractarà i aïllarà als pacients simptomàtics i es posarà en quarantena a la resta.
 - o Institucions penitenciàries: PCR prova d'elecció diagnòstica. Indicats en pacients amb alta sospita clínica. Si surt positiu, es confirma el diagnòstic, si surt negatiu, es realitza PCR.
 - o En l'àmbit comunitari: en pacients amb alta sospita clínica de diversos dies

d'evolució després de l'inici de símptomes.

El Ministerio amb data 6 d'abril del 2020 publica actualització del protocol de maneig de cadàvers:

- Ampliació de referències bibliogràfiques.
- Modificació de l'apartat d'autòpsies.

El Departament de Salut amb data 6 d'abril del 2020 actualitza protocol d'actuació en centres de salut mental i addiccions:

- Els professionals d'APiC lideraran la integració i coordinació dels diferents dispositius assistencials que es troben en la comunitat que atenen a persones amb COVID-19 i es coordinaran amb els professionals de les xarxes de salut mental i addiccions.
- Inclou canvis que s'han establert en relació a la prescripció farmacèutica.
- Hospitalització d'aguts, subaguts:
 - o En el moment d'ingrés, s'aconsella mantenir a la persona en aïllament fins a poder determinar el risc de COVID-19.
 - o Pacient amb descompensació psiquiàtrica amb sospita de COVID-19: atenció preferent, prova diagnòstica i aïllament.
 - o S'aconsella habilitar unitats mixtes per atendre casos probables i confirmats.
- UTER Acompanya'm: es farà el suport necessari per a mantenir l'atenció de les persones en el mateix recurs en coordinació amb l'APiC per als aspectes somàtics sempre que sigui possible.
 - o Es valorarà possibilitat de reubicació tant de casos concrets, com de tots els residents si es necessari en altres dispositius residencials o d'altres tipologies amb atenció compartida.

Tota la informació:

Canal Salut: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

Material divulgatiu: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:

<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>

Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf