



## Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 11 d'abril del 2020 són:

- OMS (última actualització: 8 d'abril del 2020)
- CDC (última actualització: 8 d'abril del 2020)
- eCDC (última actualització: 9 d'abril del 2020)

El Ministerio amb data 11 d'abril del 2020 publica actualització del protocol d'actuació:

- Definició de cas:
  - o Cas confirmat: cas que compleix criteri de confirmació per laboratori: PCR o test de diagnòstic positiu d'antigen o d'anticossos.
  - o Cas probable: cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic de COVID-19 no confirmat.
- S'inclou com a prova diagnòstica test ràpid d'antigen o d'anticossos.
  - o Les mostres recomanades són de sang obtingudes per extracció venosa perifèrica o per digitopunció amb llanceta. Podrà ser analitzada en el mateix punt d'extracció.
- Finalització de l'aïllament:
  - o Casos possibles, probables i confirmats que no siguin hospitalitzats: aïllament mínim de 7 dies i si porten 3 dies sense febre i sense símptomes.
  - o Casos possibles, probables i confirmats hospitalitzats: aïllament mínim de 14 dies després de l'alta hospitalària i si porten 3 dies sense febre i sense símptomes.
- Els convivents de casos hauran de realitzar quarantena durant 14 dies des de la finalització de l'aïllament del cas.
- S'inclouen Annexa (3) on hi ha informació per l'enviament de la informació agregada des de les CCAA. Hi haurà un enviament diari i un enviament setmanal els divendres.

El Ministerio amb data 26 de març del 2020 publica recomanacions per l'obtenció de plasma de donants convalsents de COVID-19:

- L'ús de plasma de pacients convalsents es considera actualment teràpia experimental.
- Inclou requisits pels donants.
- L'extracció s'ha de realitzar en centres autoritzats.
- En donacions d'afèresis es recomana extraure el volum màxim de plasma del 15% de la volèmia del donant. Anticoagulant: ACD-A o similar. Si no s'usa compensació, no extraure més de 600mL.
- Interval entre sessions no ha de ser inferior a 48 hores.
- Es respectarà sempre que sigui possible la compatibilitat ABO del plasma amb el possible receptor.
- Inclou recomanacions d'etiquetatge, emmagatzematge, transport i ús després de descongelació.

El Departament de Salut amb data 10 d'abril del 2020 publica pla d'acció per la gestió de persones en l'àmbit residencial:

- Es classifiquen els centres en tipus A, B (disposen de professionals sanitaris i no sanitaris, en l'A tenen capacitat per procurar zona d'aïllament i en el B, no) i C (sense professionals assistencials propis que no poden atendre els residents).
- Valorar la dependència dels residents amb test modificat de Barthel i test Pfeiffer. Els realitzarà professional sanitari (metge i/o infermera) de la residència o d'APiC de referència (si no s'ha realitzat en l'últim any).
- Classificar les persones en  $\alpha$  (autònomes o algun suport) i  $\beta$  (necessiten suplència total o parcial)
  - o Les  $\alpha$  sense COVID-19 ni simptomatologia es prioritzarà el retorn al seu domicili. Si no fos possible, se li assignarà una plaça en un altre recurs.
  - o Les  $\alpha$  amb COVID-19 o simptomatologia lleu se l'ubicarà en una plaça residencial adequada a la seva situació.
- Els centres han de maximitzar la seva capacitat d'albergar places possibles i han de delimitar les àrees amb persones COVID-19 positiva o amb simptomatologia compatible de la resta amb equips i circuits de treball diferents.
- En el centres tipus C prioritàriament, si totes les persones son COVID-19 negatives i no tenen simptomatologia, es realitzarà protecció total, integral i intensiva d'aquests centres i dels professionals que hi donen servei.
  - o Si no es pot realitzar, es traslladarà als residents a les places disponibles dels centres tipus A.
- Si les residències tipus A i B arriben al màxim de capacitat, es valorarà si hi ha centres disponibles tipus B que puguin ser centres COVID+. També es podran utilitzar per a pacients no COVID però seran prèviament desinfectats.
- En residències d'infància tutelada les persones amb símptomes i/o COVID-19 s'aïllaran

de forma prioritària en el mateix centre. Si no fos possible, seran evacuats.

- Procés liderat per APIC. L'atenció ha de ser garantida 7x24h.
- Es realitzarà el test als residents pels professionals d'APIC.

### **Tota la informació:**

**Canal Salut:** <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

**Material divulgatiu:** <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

**Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:**  
<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>

**Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:**  
[http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia\\_salut\\_publica/alertes\\_salut\\_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf](http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf)