

ESCALA DE PRIORITZACIÓ DE TRASLLAT DEL PACIENT CRÍTIC

en el context de la infecció pel **Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Donat l'increment de pacients crítics per Covid-19, es proposa configurar una escala de priorització de trasllat per aquest tipus de pacients, per tal d'**optimitzar la gestió de la taula de Trasllet Interhospitalari (TIH) de CECOS** i donar la millor resposta de sistema.

| PUNTUACIÓ | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--|-----|-----|----|--------|---------|------------------|-----|
| Edat | | | | >70a | 50a-70a | <50a | |
| Centre Emissor | | | | UCI Sí | UCI No | | |
| PaFi | | | | >100 | 100-75 | 74-50 | <50 |
| VMI | | | | No | Sí | Sí + Pronació | |
| Xoc | | | | No | Sí | | |
| Insuficiència renal | | | | No | Sí | | |
| Comorbiditat⁽¹⁾ | | >1 | 1 | Cap | | | |
| Estat basal (Escala de Rockwood) | ≥IV | III | II | I | | | |








SCORE

| | |
|----------|---------------------------------|
| 0 | 10-7 |
| 1 | 6-4 |
| 2 | < 4 |
| 3 | EDAT >75a o ROCKWOOD ≥ IV |

El resultat SCORE és orientatiu. Individualitzar la valoració de cada pacient.

(1) EPO GoldB-C-D; AVC amb clínica residual; IC NYHA ≥ 2; Malalties neurodegeneratives; Fibrosi pulmonar; Neoplàsies actives (no en remissió completa); Cirrosi hepàtica Child B-C

ESCALA DE FRAGILITAT DE ROCKWOOD

| NIVELL | SITUACIÓ FUNCIONAL | ACCIÓ RECOMANADA |
|---|---|--|
|  I | Sana i en forma Enèrgica, robusta, practicant esport habitual, sense patologies de base. | VMI |
|  II | Saludable Sense malalties ni símptomes de base, exercici ocasional. No limitacions per ABVD | VMI |
|  III | Controlada Persona amb problemes crònics ben controlats, sense limitacions funcionals i practicant exercici en forma de caminar | Segons edat: <75a: O ₂ . VMI >75a: O ₂ alta concentració |
|  IV | Vulnerable Persona amb problemes crònics ben controlats, sense necessitat d'ajuda en la vida diària però "més lenta i cansada". Els símptomes limiten lleument la vida. | O ₂ alta concentració |
|  V | Fragilitat lleu Persona que necessita ajuda per activitats complexes de vida diària (finances, desplaçaments, feines domèstiques, medicacions). Patologies cròniques avançades, símptomes persistents i ingressos per descompensació. | O ₂ alta concentració |
|  VI | Fragilitat moderada Persona amb patologia crònica múltiple i/o estat de fragilitat que requereix ajuda per algunes activitats bàsiques de vida diària (dutxa, wc, vestit, deambulació, transferències) i per totes les instrumentals i avançades. | O ₂ alta concentració |
|  VII | Fragilitat greu – estat final de vida Dependència per totes les activitats bàsiques de vida diària. Vida sofà – llit. | O ₂ alta concentració |

