


Procediment d'actuació davant una persona amb infecció per COVID-19 – Residències



- Valoració "in situ" de les condicions i la gestió de les mesures de prevenció i control de la infecció a la residència¹. Aquesta valoració inclou: estat dels residents, neteja², gestió de residus¹, estat dels professionals, aïllaments³ i coneixement i ús de les mesures i els equipaments de protecció. D'aquesta valoració es poden identificar 4 situacions:
 - Residències sense casos COVID (confirmats o sospitosos) i mesures adients de prevenció i control de la infecció. Fer seguiment proactiu periòdic.
 - Residències sense casos COVID (confirmats o sospitosos) i mesures no adients de prevenció i control de la infecció. Deficiències en neteja, gestió de residus i/o mesures previstes d'aïllament, assessorar i contactar amb Salut Pública. Deficiències en les mesures de protecció a residents i professionals, donar suport formatiu als professionals per a l'ús dels EPI. Visita de seguiment i control telefònic proactiu per veure l'adherència a les mesures aplicades.
 - Residències COVID+ (amb casos confirmats i/o sospitosos) i mesures adients de prevenció i control de la infecció. Identificació de casos (realització de PCR segons protocol vigent), sectorització de residents i professionals, donar suport assistencial per garantir la correcta atenció. Seguiment presencial diari segons coordinació amb equip assistencial residencial propi.
 - Residències COVID+ (amb casos confirmats i/o sospitosos) i organització no adequada. Identificació de casos (realització de PCR segons protocol vigent). Valoració conjunta amb Salut Pública i Xarxa de Vigilància Epidemiològica. Elaborar proposta de mesures, comunicació a la Regió Sanitària, seguiment presencial diari de l'aplicació de les mesures.
 - Garantir l'atenció 7/24 en qualsevol situació.
- Valoració actual del resident:
 - Revisió d'antecedents patològics, clínics o d'interès.
 - Detecció proactiva de persona en situació de cronicitat complexa (PCC) i/o malaltia crònica avançada (MACA).
 - Revisió Pla de medicació.
 - Valoració funcional de la persona (Barthel). Valoració geriàtrica integral per detectar síndromes geriàtriques; UPP (Braden), disfàgia (EAT-10), incontinència, restrenyiment (Bristol), deliri (CAM), deteriorament cognitiu (Pfeiffer si no té diagnòstic de demència, Lobo i GDS si té demència) i valoració nutricional (MNA short form).
 - Pla d'intervenció individualitzat i compartit (PIIC).
- En cas de persona en situació de cronicitat complexa (PCC) i/o malaltia crònica avançada (MACA):
 - Identificació de persona amb necessitats complexes d'atenció (PCC) o de situació de malaltia crònica avançada mitjançant instrument NECPAL.
 - En les persones identificades com a MACA, comprovar l'existència de voluntats anticipades (DVA) i si està establerta la planificació de decisions anticipades (PDA).
 - Avaluació de l'esforç terapèutic en relació amb els objectius de vida de la persona (màxima supervivència, màxima funcionalitat o abordatge simptomàtic).

Referències:

- <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-2/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-residencies.pdf>
- <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-2/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatricques.pdf>
- <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-2/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf>