



## Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 5 de maig del 2020 són:

- OMS (última actualització: 28 d'abril del 2020)
- eCDC (última actualització: 29 d'abril del 2020)
- Ministerio de Sanidad (última actualització: 4 de maig del 2020)

El CDC amb data 3 de maig del 2020 actualitza guia per la finalització de l'aïllament de les persones amb COVID-19:

- Mantenir l'aïllament almenys 10 dies des de l'aparició de símptomes i portar almenys 3 dies sense febres i millora dels símptomes respiratoris.

El CDC amb data 30 d'abril del 2020 actualitza guia per la recollida i enviament de mostres postmortem de persones confirmades o sospitoses:

- Inclou recomanacions per a la recol·lecció òptima de mostres de teixit.
- Si no es poden recollir mostres nasofaríniques, es donen com a vàlides les següents mostres del tracte respiratori: mostres de la orofaringe, del cornet central nasal, de la fossa nasal anterior o d'aspirat nasofaríngi o aspirat nasal.
- Inclou consideracions del temps de recol·lecció de mostres i de les proves serològiques en cadàvers.

El Departament de Salut amb data 27 d'abril del 2020 publica guia per l'ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals:

- PCR:
  - o És la prova de referència per al diagnòstic de la malaltia en persones que presenten simptomatologia.
  - o És una prova de suport per la reincorporació laboral en professionals que hagin patit la malaltia o hagin tingut un contacte de risc sense protecció.

- Es pot fer servir per l'estudi de contactes de risc.
- No està indicada en persones que no han tingut contacte de risc, o no tenen, ni han presentat, símptomes compatibles amb COVID-19.
- Test serològic d'anticossos:
  - Té un escàs valor diagnòstic.
  - Podria tenir valor en el cribatge de l'estat d'immunitat de la població.
  - Es fa servir com a prova de suport de reincorporació laboral en casos lleus que mantenen PCR positiva.
- Test antigènic:
  - Permet el diagnòstic de la infecció en fases inicials (<3 dies).
  - Actualment no es consideren en l'estratègia.
- Reincorporació de treballadors amb símptomes compatibles amb COVID-19:
  - Si PCR: a partir del dia 7 d'inici de símptomes en casos lleus o 14 dies des de l'alta hospitalària en casos hospitalitzats; almenys 3 dies sense febre; millora simptomatologia.
    - PCR negativa: reincorporació i valorar ús de mascareta fins al dia 14 de l'inici de símptomes.
    - PCR positiva: repetir setmanalment fins que sigui negativa. A partir dels 14 dies, si és positiva, es pot realitzar test serològic i amb valoració mèdica es pot indicar la reincorporació.
  - Si no PCR:
    - Almenys 3 dies des de la recuperació (no febre i millora de símptomes).
    - Mascareta fins resolució de símptomes o fins 14 dies després de l'inici de la malaltia.
    - Autocontrol de símptomes.
- Contacte estret per exposició a un cas sense protecció:
  - 14 dies en aïllament domiciliari.
  - Si no hi ha símptomes, a partir del dia 7 es pot fer PCR i si és negativa s'indica la reincorporació.

**Tota la informació:**

**Canal Salut:** <http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

**Material divulgatiu:** <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

**Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:**

<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>