



Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 30 d'abril del 2020 són:

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 24 d'abril del 2020)
- OMS (última actualització: 28 d'abril del 2020)
- eCDC (última actualització: 29 d'abril del 2020)

El Departament de Salut amb data 30 d'abril del 2020 actualitza el protocol pel tractament farmacològic de pacients adults amb infecció per SARS-CoV-2:

- S'afegeix el requeriment de fer seguiment electrocardiogràfic durant el tractament amb hidroxiclороquina sempre que sigui possible.
- Criteris utilització tocilizumab:
 - o Presència d'infiltrats pulmonars bilaterals o empitjorament radiològic i/o gasomètric en 24 hores en malalts ingressats;
 - o Hipoxèmia, definida com $PaO_2/FiO_2 < 300$ i
 - o Com a mínim un d'aquests paràmetres inflamatoris: $IL6 \geq 40ng/l$ (o $PCR \geq 100mg/dl$), $dímer-D \geq 1000ng/ml$ o $ferritina \geq 700ng/ml$.
- S'afegeix enllaç a nota informativa sobre l'ús hidroxiclороquina en l'àmbit extrahospitalari.
- A través de la valoració dels criteris de fragilitat, es proposa els NIDT com a eina per ajudar en la derivació dels pacients de residències.
- S'afegeix enllaç a nota informativa sobre el maneig de dones amb infecció o sospita d'infecció tractades amb teràpia hormonal per menopausa i anticoncepció hormonal combinada.
- No es recomana la utilització de corticoesteroides per prevenir la SDRA en pacients amb infecció per SARS-CoV-2 en cap àmbit assistencial.
- S'afegeix enllaç a estudis observacionals autoritzats per l'AEMPS.

*També actualitza document “Algoritmes de tractament dels pacients amb infecció per SARS-CoV-2” i el document “Recull de l’evidència del tractament farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2”.

El CDC amb data 29 d’abril del 2020 actualitza guia de recollida, manipulació i test de mostres:

- Les mostres s’han de col·locar immediatament en un tub de transport estèril amb 2-3mL de solució de transport viral, solució de transport d’Amies o solució salina estèril, exceptuant si s’utilitza un test dissenyat per ser analitzat directament.
- Es suprimeix la preferència de recollida de mostres nasofaríngies.
- EPI recomanat per recollida de mostres: respirador N95 (o mascareta quirúrgica si no hi ha disponibilitat), ulleres de protecció, guants i bata.

Tota la informació:

Canal Salut: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

Material divulgatiu: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2:
<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>

Algoritme d’actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf